



syngenta



**Raccomandazioni per il  
corretto impiego**



# Raccomandazioni d'impiego sulle colture frutticole

Coltura	Parassita	Dose g/hl	Dose g/ha	Epoche di applicazione
MELO PERO	<i>Melo:</i> Afidi grigio, verde, lanigero, psille, tentredini e fillominatori <i>Pero:</i> Afidi, tentredini, psilla	30-40	300-450	1) due/tre settimane prima della fioritura 2) da post-fioritura a 14 giorni dalla raccolta
PESCO NETTARINA PERCOCHE	Afide verde, farinoso, nero, cicalina verde	15-30	200-300	1) Da gemme rigonfie a 10 giorni prima della fioritura 2) Da post-fioritura a 14 giorni dalla raccolta
ARANCIO LIMONE MANDARINO CLEMENTINO	Afidi	12	200-300	1) In pre-fioritura 2) Da post-fioritura a 28 giorni dalla raccolta

**Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata pre-fioritura (almeno 10 giorni prima)**

**Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto**

**E' consentito un solo trattamento all'anno**

# Raccomandazioni d'impiego su vite

FITOFAGO  
BERSAGLIO



Pre-fioritura



Fioritura



Allegazione



Accrescimento  
acini



Pre- chiusura  
grappolo



Chiusura  
grappolo



Invaiaura

**SCAFOIDEO**

(forme  
giovani)

**Non effettuare  
trattamenti**



**CICALINE**

**VERDI**  
(ninfe)

**SCAFOIDEO**


(adulti)



## Avvertenze:

- 1) Eseguire una sola applicazione per anno indipendentemente dall'avversità
- 2) Non effettuare trattamenti in fioritura
- 3) Effettuare lo sfalcio delle eventuali infestanti fiorite prima dell'applicazione del prodotto


# Raccomandazioni d'impiego su pomodoro



\* Actara vassoi: impiego in corso di registrazione

**AVVERTENZA:**  
Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)

# Raccomandazioni d'impiego su melone




\* Actara vassoi: impiego in corso di registrazione

## AVVERTENZA:

**Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)**

# Raccomandazioni d'impiego su patata



Dorifora  
Afidi



Dorifora  
Afidi



fogliare

**Non  
effettuare  
trattamenti**

**AVVERTENZA:**

**Non effettuare i trattamenti né in fioritura, né in immediata prefioritura (almeno 10 giorni prima)**