

# BIG RED®

## EA 4006 (cov in corso)

BIG RED® è un'albicocca di inizio stagione, la cui epoca di maturazione si colloca tra ORANGERED®Barth(cov) e GOLDRICH.



## FRUTTO

- **Epoca di maturazione** : E' una varietà di inizio stagione. 10 gg dopo PINKCOT®Cotpy(cov), 5 giorni dopo ORANGERED®Barth (cov), 3 giorni prima di GOLDRICH.
- **Sapore** : Molto buono, la polpa é profumata e succosa. IR di 14°Brix.
- **Polpa / Buccia** : La polpa é soda, di colore aranciato intenso. La buccia, di spessore medio, presenta delle leggere irregolarità al tatto. E' dotata di buona resistenza a manipolazioni e a calibratura meccanica. Può essere sensibile a macchie nella cavità peduncolare se le piante sono sovraccariche.
- **Conservazione** : Da molto buona a normale per l'epoca. La tenuta in frigorifero raggiunge 2 settimane, 1 settimana su scaffale.
- **Aspetto** : Eccezionale, con una sfaccettatura ("blush") rosso viva estesa su oltre il 75 - 85% della superficie dei frutti esposti al sole. E' di forma rotonda, con colore di fondo aranciato intenso : fino a 9 del codice colore CTIFL.
- **Calibro / Carico produttivo** : Buona pezzatura, ripartita nella misura del 65% di 2A e 35% di 3A, in condizioni di carico produttivo normale. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, possiamo stimare un potenziale produttivo di 35 t/ha in frutteti adulti. Le prove di gestione dell'albero in corso presso le Stazioni sperimentali ci daranno informazioni più precise nel prossimo futuro. La pezzatura è influenzata da un diradamento precoce.
- **Raccolta** : Si effettua in 2 - 3 stacchi. E molto importante non anticipare la raccolta. Il colore si forma presto (tipo KIOTO) e, grazie alla notevole tenuta dei frutti sull'albero, non c'è bisogno di andare di fretta : il calibro aumenta negli ultimi giorni, alla giusta maturazione del frutto.

## ALBERO

- **Vigore** : Da elevato a molto elevato, con un portamento assurgente. Si consiglia di aumentare il numero delle branche in fase di allevamento. Tipo BERGAROUGE®Arvine(cov).
- **Potatura / Allevamento** : Indirizzate la fruttificazione sulle formazioni corte (mazzetti di maggio e dardi). Eseguite interventi di rinnovo per mantenere perenni gli organi fruttiferi. Attenzione a non sprecare i ricacci all'interno della chioma, visto che sono difficili da ottenere.
- **Entrata in produzione** : Buona e rapida; in ogni caso bisogna avere il buon senso di non far produrre i rami di un anno per non pregiudicare la qualità dei frutti.

## FIORI

- **Entità della fioritura** : Da abbondante a normale ; epoca TOM COT®Toyaco (cov), GOLDRICH.
- **Impollinazione** : OBBLIGATORIA con TOM COT®Toyaco (cov), SOLEDANE (cov), PINKCOT®Cotpy (cov), SYLRED (cov), SPRING BLUSH®3126TH(cov), EARLY BLUSH®Rutbhart (cov), SWEET RED® Redsilver (cov). Per sicurezza mettete due varietà impollinatrici nel frutteto.



### • LEGGENDA

® : Marchio registrato  
 COV : Certificato di Ottenimento Vegetale. Moltiplicazione vietata senza autorizzazione.