

Tab. 4 - Sensibilità principali infestanti dicotiledoni annuali agli erbicidi di post-emergenza

<i>Fallopia</i>	<i>Polygonum aviculare</i>	<i>P. persicaria</i> <i>P. lapathifolium</i>	<i>Amaranthus</i>	<i>Chenopodium</i>	<i>Solanum</i>	<i>Abutilon</i>	<i>Ammi majus</i>	Crucifere
terbutilazina	prosulfuron	terbutilazina	terbutilazina	terbutilazina	terbutilazina	mesotrione	prosulfuron	terbutilazina
prosulfuron	terbutilazina	prosulfuron	rimsulfuron (1)	mesotrione	foramsulfuron	sulcotrione	MCPA	rimsulfuron
dicamba		dicamba	nicosulfuron (1)	sulcotrione	mesotrione	tembotrione		nicosulfuron
fluroxipir		mesotrione	foramsulfuron (1)	tembotrione	sulcotrione	prosulfuron		foramsulfuron
		sulcotrione	prosulfuron (1)	bromoxinil	tembotrione	fluroxipir		prosulfuron
		tembotrione	tifensulfuron (1)	bentazone	bromoxinil			tifensulfuron
		bentazone	tritosulfuron (1)		bentazone			tritosulfuron
			tembotrione					bromoxinil

(1) escluse popolazioni resistenti erbicidi ALS